

「ノコギリヤシオイル SC」摂取による健常な日本人中高年男性を 対象にした臨床試験を実施

この度、当社製品「ノコギリヤシオイル SC」を用いて健常な日本人中高年男性を対象としたヒト臨床試験を実施した結果、一日摂取目安量 320mg/日の摂取において IPSS スコアが改善することを確認しました。本試験の詳細は『薬理と治療』に掲載されています。

薬理と治療(*Jpn Pharmacol Ther*) vol.48 no.3 429-440(2020)

「Verification Study on the Effects of Saw Palmetto Fruit Extract on Urination Issues.
-A Randomized Double-blind, Parallel-group, Placebo-controlled Study-」

試験概要

- ・対象者：健康な日本人中高年男性（40歳以上の男性 44人）
- ・摂取方法：「ノコギリヤシオイル SC」を 320 mg 含有したカプセルを 1日 1粒、就寝前に摂取
- ・測定項目：IPSS スコア、OABSS スコア、アンケート、その他安全性試験項目等
- ・摂取期間：8週間

結果・結論

本臨床試験では BGG Japan 製「ノコギリヤシオイル SC」の摂取（320 mg/日）により、摂取 8週目でプラセボ摂取群と比較して IPSS スコア（排尿に関する満足度評価スコア）が改善することが示唆された（ $p=0.042$ ）。

以上